

INFORMATION ZUR AKTUELLE S2K LEITLINIE

SEHR GEEHRTE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,

bei Ihrer Patientin/Ihrem Patienten wurde histologisch ein *Helicobacter pylori* nachgewiesen.

Wir möchten Sie mit dieser Information auf die Empfehlungen der überarbeiteten **S2k Leitlinie 2/2016 der DGVS „Helicobacter pylori und gastroduodenale Ulkuskrankheit“** hinweisen.

Aufgrund der hohen Resistenzraten gegenüber Clarithromycin und Metronidazol wurde der Therapiealgorithmus entsprechend angepasst.

NAME	LINIE	SCHEMA	DOSIERUNG	DAUER
Standard-Triple-Therapie (italienisch)	1°-Linie	PPI ¹ Clarithromycin 250-500mg Metronidazol 400-500mg	1-0-1 1-0-1 1-0-1	7-14 Tage
Standard-Triple-Therapie (französisch)	1°-Linie	PPI ¹ Clarithromycin 500 mg Amoxicillin 1000 mg	1-0-1 1-0-1 1-0-1	7-14 Tage
Bismuthaltige Vierfachtherapie ²	1°-Linie oder 2°-Linie nach Standard-TT	PPI ² Bismut-Kalium-Salz 140 mg Tetracyclin 125 mg Metronidazol 125 mg	1-0-1 3-3-3-3	10 Tage
kombinierte („konkomittierende“) Vierfachtherapie	1°-Linie	PPI ¹ Clarithromycin 500 mg Amoxicillin 1000 mg Metronidazol 400-500mg	1-0-1 1-0-1 1-0-1 1-0-1	7 Tage
Fluorochinolon-Tripletherapie	2°-Linie	PPI ¹ Levofloxacin 500 mg/ Moxifloxacin 400 mg Amoxicillin 1000 mg ³	1-0-1 1x1 1-0-1	10 Tage

1 Omeprazol 20 mg, Pantoprazol 40 mg, Esomeprazol 20 mg, Lansoprazol 30 mg, Rabeprazol 20 mg.

2 Fixe Kombination (Pylera®) zugelassen in Kombination mit Omeprazol 20 mg.

3 Bei Penicillinunverträglichkeit Rifabutin 150mg 1-0-1.

WIR EMPFEHLEN ALS ERSTLINIENBEHANDLUNG:

- BISMUT-HALTIGE-VIERFACHTHERAPIE (PYLERA) ÜBER **10 TAGE** (SIEHE TABELLE)

Insbesondere bei Herkunft des Patienten aus Süd- oder Ost-Europa, d.h. Gebieten mit hoher Clarithromycinresistenz oder bei Vorbehandlung mit Makroliden oder bei Penicillinallergie.

ODER ALTERNATIV DIE

- STANDARD-TRIPLE-THERAPIE FRANZÖSISCH ÜBER **(7)-14 TAGE** (SIEHE TABELLE)

Zur besseren Verträglichkeit der Eradikationsbehandlung kann eine zusätzl. Probiotikagabe erfolgen.

Wir danken für die gute Zusammenarbeit und stehen für Rückfragen und Anregungen gerne zur Verfügung.

Mit den besten kollegialen Grüßen

Dr. med. Cordula Bartel-Kowalski & Dr. med. Rainer Speda